

5. Shranjevanje izdelka Bronchomed Junior

Izdeka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na nalepki in škatli. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.



Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Po uporabi stekleničko tesno zaprite. Vsebino uporabite v štirih tednih po odprtju stekleničke.



Stekleničko shranjujte v izvirni ovojnini za zaščito pred svetlobo.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Povsetujte se s farmacevtom o tem, kako zavreči medicinske pripomočke, da zaščitite okolje.

6. Vsebina pakiranja in druge informacije

Videt izdelka Bronchomed Junior

Izdelek Bronchomed Junior je svetljareva tekočina. Njegove naravne sestavine lahko povzročijo nastanek drobnih delcev. Ti delci nikakor ne vplivajo na kakovost sirupa.

Pohijen je v flavi steklenički s prostornino 120 ml/200 ml in 240 ml zatenjene z izvirno navojno zaporko. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja. Priložena merica za leztvico od 25 ml do 20 ml omogoča hantančno odmerjanje priporočene količine.

Dodatne informacije

Proizvajalec:

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck, Nemčija

Proizvodnja:
Kwizda Pharma GmbH,
Effingergasse 21,
1160 Dunaj, Avstrija

Pooblaščeni predstavnik v Sloveniji:
OPH Oktal Pharma d.o.o.
Pot k sejnišču 26a,
1231 Ljubljana-Črnivec

Slovenija
Številka serije je navedena na nalepkki in škatli. Lot

CE 0482

Bronchomed Junior je blagovna znamka družbe Kwizda Pharma
Datum zadnje revizije Februar 2019
Lastni sluzni film telesa, ki ohranja bronhe vlažne in jih varuje pred izsuštvijo, vsebuje več sestavin, npr. mrтve celice, razlike beljakovine in bele krvne celice.

14287_1_SI
227



NAVODILO ZA UPORABO

Bronchomed Junior 120 ml

Slez in med

Spoštovanji.

Z izdelkom Bronchomed Junior ste izbrali zanesljiv in hitro delujoč izdelek zase in za svojo družino, ki bo v ponoč pri vsakem kašiju ob prehladu, suhem ali mokrem.

Preden vzamete ta sirup proti kašiju, natančno preberite celotno navodilo za uporabo.

Navodilo vsebuje

1. Kaj je izdelek Bronchomed Junior in za kaj se uporablja?
2. Kaj vsebuje izdelek Bronchomed Junior?
3. Kaj morate vedeti, preden vzamete izdelek Bronchomed Junior?
4. Kako jemati izdelek Bronchomed Junior?
5. Shranjevanje izdelka Bronchomed Junior?
6. Vsebina pakiranja in druge informacije.

1. Kaj je izdelek Bronchomed Junior in za kaj se uporablja?

Dragoceni glavni sestavini, slez in med, v izdelku Bronchomed Junior delujejo kot balzam, ki pokrije vneto žrelino sluznice in jo s tem pomirja. Sluz tvorfinično zaščitno prevleko proti tujkom, s čimer blaži suh, dražeč kašelj in omogoča, da si sluznica opomore.

Izdelek Bronchomed Junior zanesljivo in hitro ublaži vsak kašelj ob prehladu, suh ali moker. Poleg tega je izdelek Bronchomed Junior v pomoč pri zaščiti sluznice ust in žleha, kadar je ta suha. Tanka plast izdelka bo pri govoru in petju zaščitila sluznico in ublažila neprijetne simptome, kot so kašelj, žgelekanje v gnu in odkašljevanje.

Izdelek Bronchomed Junior je sirup proti kašiju, ki vsebuje večinoma naravne sestavine in je brez alkohola.

Izdelek se dobro prenaša, zato je primeren za otroke.

Izdelek je primeren za dnevno in nočno uporabo. S svojim blažilnim učinkom pripomore k minemu in krepilnemu spancu.

Suh kašelj – dražeč kašelj

Suh ali dražeč kašelj je običajno brez sluzi, sprožijo pa ga lahko različni dražljaji. Na začetku ali na koncu ciklusa kašja ob prehladu lahko pride do draženja sluznic zgornjih dihal. Sluznice lahko dražijo tudi suh zrak, tukti, kot so prah ali alergeni, ter virusi in bakterije.

Moker kašelj – produktiven kašelj

Lastni sluzni film telesa, ki ohranja bronhe vlažne in jih varuje pred izsuštvijo, vsebuje več sestavin, npr. mrтve celice, razlike beljakovine in bele krvne celice.





Pharmacode 227


Pri boleznih dihal se lahko spremeni njegova sestava, barva in konsistenco. Če se tvorba služi poveča, poskuša telo cezerno sluz iz razvejanega mrežja bronhov odstraniti s kašljem. Sluz lahko izkašljate v ustno votlino, kjer jo lahko pogoljete ali izpljujete.

Izdelek Bronchomed Junior pomaga ublažiti draženje tudi pri mokrem kašlu, ko je razdražena žlena sluznica.

Zanesljivo olajšanje kašla

Refleks kašla je bistvenega pomena za čiščenje dihalnih poti. Sproži se, če so prisotni izločki in jih je treba izkašljati. Pri takoj imenovanem produktivnem kašlu povzroči kašel nakopičena sluz. Receptorje za kašelj lahko aktivirajo tudi tujki, s čimer sprožijo refleks kašla ("suh kašel").

Izdelek Bronchomed Junior blžji refleks kašla v fazah suhega in produktivnega/mokrega kašla tako, da prekrije receptorje za kašelj z zaščitno plastjo.



2. Kaj vsebuje izdelek Bronchomed Junior?

15 ml izdelka Bronchomed Junior vsebuje:
143 mg suhega izvlečka slze,
750 mg medu.

Druge sestavine: ksilitol, ksantan, brezvodni glicerol, citromska kislina, aroma jagode, metil-4-hidroksibenzoat, propil-4-hidroksibenzoat, prečiščena voda. Izdelek Bronchomed Junior je brez umetnih barvil, laktoze, glutena, alkohola in brez gensko spremenjenih organizmov.

3. Kaj morate vedeti, preden vzamete izdelek Bronchomed Junior?

Izdelka Bronchomed Junior ne jemljite, če ste alergični na slez ali med ali katero kolik drugo sestavino tega medicinskega

pripravnika, navedeno v poglavju 2. Če pride do alergijske reakcije, izdelek prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
15 ml izdelka Bronchomed Junior vsebuje 2,76 g ksilitola. Kalorična vrednost ksilitola je 2,4 kcal/g. Ksilitol ima lahko odvajalni učinek.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Uporaba pri pacientih s preobčutljivostjo za sladkorje

Bolniki z redko prirojeno preobčutljivostjo za fruktozo ali malabsorpcojo glukozе in galaktoze ne smejo jemati tega izdelka, saj vsebuje med.
Uporaba pri bolnikih s sladkorovo boleznjijo
15 ml izdelka Bronchomed Junior vsebuje 0,3 OE (ogljikohidratnih enot).

Uporaba med nosečnostjo in dojenjem

Uporaba izdelka Bronchomed Junior ni priporočljiva med nosečnostjo in dojenjem.

Uporaba pri otrocih

Otroki, mlajše od 3 let, mora pregledati zdravnik, da izključi resnejše bolezni. Uporaba pri otrocih, mlajših od 1 leta, ni priporočljiva.

Sočasna uporaba izdelka Bronchomed Junior z drugimi zdravili

Če jemljete druga zdravila, se priporoča, da jih vzamete od pol ure do eno uro pred jemanjem izdelka Bronchomed Junior ali po njem.

Posvetujte se z zdravnikom, če:

Simptomi po petih dneh ne izginijo ali se postlabšajo. Se pri uporabi izdelka Bronchomed Junior pojavijo oteženo dihanje, zvišana telesna temperatura ali gnojeni izmecel.

Izdelek Bronchomed Junior vsebuje konzervansa metil-4-hidroksibenzoat in propil-4-hidroksibenzoat, ki lahko povzročita alergijske reakcije (te so lahko zapozne).

4. Kako jemati izdelek Bronchomed Junior?

Za lažje odmerjanje je priložena merica.

Otroci, stari od 6 do 11 let: 15 ml do štirikrat na dan.
Otroci, stari od 4 do 5 let: 7,5 ml do štirikrat na dan.
Otroci, stari od 2 do 3 leta: 5 ml do štirikrat na dan.
Otroci, stari eno leto ali več: 5 ml do trikrat na dan.
Izdelek Bronchomed Junior se lahko jemlje podnevi in vnoči.

Za najboljše rezultate je izdelek Bronchomed Junior priporočljivo jemati tako pogosto, kot je priporočeno.
Če ste v dvornih ali in imate kakršno koli vprašanje ali pomislek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.



524718_Packz.pdf



28. 02. 2019 15:01:53

