

## NAVODILO ZA UPORABO

### **Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo** betametazon/salicilna kislina

#### **Pred uporabo natančno preberite navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

#### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Diprosalic mazilo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Diprosalic mazilo
3. Kako uporabljati zdravilo Diprosalic mazilo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Diprosalic mazilo
6. Dodatne informacije

### **1. KAJ JE ZDRAVILO DIPROSALIC MAZILO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilo Diprosalic mazilo lahko uporabljamo za lajšanje vnetja, suhosti, srbenja in neprijetnega občutka, ki se lahko pojavi pri psoriazii (luskavica, je vnetna kronična kožna bolezen z značilnimi kožnimi žarišči), seboreji (kožna bolezen za katero je značilno veliko izločanje maščobe), ekcemu (alergijska kožna bolezen z rdečim in srbečim izpuščajem), dermatitisu (vnetje kože, ki ga povzročijo zunanji dejavniki) in drugih boleznih kože ali lasišča, ki se odzivajo na glukokortikoidna zdravila.

### **2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO DIPROSALIC MAZILO**

#### **Ne uporabljajte zdravila Diprosalic mazilo:**

- če ste alergični (preočutljivi) na betametazon ali salicilno kislino ali katerikoli sestavino zdravila Diprosalic mazilo
- če imate akne (pogosta bolezen kože zaradi zamašitve žlez lojnic), rosaceo (kronično ponavljajoče se vnetje obraza in dekolteja), kožne ulkuse (razjede na koži), virusne in glivične infekcije.

#### **Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Diprosalic mazilo:**

- izogibajte se dolgotrajni uporabi in uporabi na velikih površinah kože, izogibajte se nanašanju zdravila Diprosalic mazilo na odprte rane ali poškodovano kožo,
- to zdravilo je namenjeno le uporabi na koži ali lasišču,
- izogibajte se stiku zdravila z očmi, sluznicami (npr. usta ali notranjost nosu) in predelu pod plenici. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če se spremembe na koži ali lasišču poslabšajo ali so videti okužene ali prekomerno izsušene.

#### **Otroci in mladostniki**

Podatkov o uporabi pri otrocih ni na voljo, zato se uporabe tega zdravila pri otrocih ne priporoča.

**Jemanje drugih zdravil:**

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

**Nosečnost in dojenje**

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Zdravila ne smete uporabljati pogosteje ali dlje časa, kot priporoča vaš zdravnik.

Ker varnosti uporabe lokalnih kortikosteroidov pri nosečih ženskah še niso ugotovili, smete zdravila iz te skupine predpisati v času nosečnosti le, če pričakovana korist zdravljenja matere upraviči morebitno tveganje za plod. Pri nosečih ženskah ne smete v veliki meri predpisovati zdravil iz te skupine v večji količini ali za daljši čas.

Ker ni znano, ali lahko lokalna uporaba kortikosteroidov vodi do zadostne sistemske absorpcije zdravila za prehajanje zdravila v materino mleko v merljivih količinah, se morate odločiti, ali naj mati preneha dojit ali pa uporabljati zdravilo, upoštevajoč pomembnost zdravila za mater.

**Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Zdravilo Diprosalic mazilo ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

**3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO DIPROSALIC MAZILO**

Pri uporabi zdravila Diprosalic mazilo natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nanesite tanko plast zdravila Diprosalic mazilo na prizadeti predel in ga nežno vtrite v kožo ali lasišče, običajno dvakrat na dan (zjutraj in zvečer) oz. po navodilih vašega zdravnika. Zdravljenega predela ne povijajte s povojem ali s čim drugim, razen če vam tako naroči zdravnik. Po uporabi tega zdravila si umijte roke.

Po nanosu zdravila prizadete kože ne smete poviti ali kako drugače prekriti, razen če vam tako svetuje zdravnik.

**Če ste uporabili večji odmerek zdravila Diprosalic mazilo, kot bi smeli:**

Zdravilo Diprosalic mazilo uporabljajte le v priporočenem odmerku. Če ste zdravilo uporabili v velikih količinah ali dlje, kot je predpisano, se obrnite na svojega zdravnika

**Če ste pozabili uporabiti zdravilo Diprosalic mazilo:**

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Diprosalic mazilo v skladu z navodili, ga nanesite čimprej je mogoče, potem pa nadaljujte z rednim režimom odmerjanja.

Zdravnik vam bo svetoval, kdaj prenehajte uporabljati zdravilo Diprosalic mazilo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

**4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Diprosalic mazilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Četudi ni nujno, da se bodo pojavili vsi navedeni neželeni učinki, boste lahko potrebovali zdravniško pomoč, če se pojavijo. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če kateri od naslednjih neželenih učinkov traja ali je moteč.

*Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti:* pekoč občutek, srbenje, draženje, okužba, suha ali razpokana koža, draženje ali pordelost obraza, povečana dlakavost, akne, spremembe barve kože, tanjšanje kože z nagnjenostjo k podplutbam, strije, bolečina, vnetje.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

## **5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DIPROSALIC MAZILO**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake Uporabno do:. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila Diprosalic mazilo, če ste opazili kakršnekoli spremembe v videzu mazila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje

## **6. DODATNE INFORMACIJE**

### **Kaj vsebuje zdravilo Diprosalic mazilo**

-Zdravilni učinkovini sta: betametazon in salicilna kislina. 1 g mazila vsebuje 0.5 mg betametazona, kar ustreza 0,64 mg betametazondipropionata in 30 mg salicilne kisline.

-Pomožne snovi so: tekoči parafin, beli vazelin

### **Izgled zdravila Diprosalic mazilo in vsebina pakiranja**

Mazilo je bele do umazano bele barve, motno in brez delcev.

Zdravilo Diprosalic mazilo je pakirano v škatle z aluminijasto tubo po 50 g.

### **Način in režim izdaje zdravila**

Rp-Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija

### **Izdelovalec**

SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 9.5.2017.**

Za vse morebitne nadaljne informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.