

Aptamil Pregomin ADC od rojstva naprej

SAMO ZA ENTERALNO UPORABO

Aptamil Pregomin ADC se mora uporabljati samo na recept, ki ga predpiše zdravnik. V tabeli za hranjenje so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

Starost dojenčka	Približna teža (kg)	Št.hranjenj na 24 ur	Za en obrok potrebujete	
			količina vode ml	število meric ADC
Od 0 – 14 dni	2,5-3	7	60	2
2 – 8 tednov	3-3,5	6	90	3
2 meseca	3,5-4	5	120	4
3 mesece	4-5	5	150	5
4 mesece	5-6	5	180	6
5 mesecev	6-7	5	210	7
Po 6. mesecu	> 7	4	210	7

¹Standardna raztopina:

100 ml obroka = 90 ml vode (zaželeno 40° C) + 3 merice Aptamil ADC = 276 kJ (66 kcal).

Do vrha napolnjena in z nožem do roba poravnana priložena merica vsebuje približno 4,5 g. Uporabljajte le priloženo merico. Formule ne pripravljajte močnejše ali šibkejše koncentracije kot je navedeno.

Uporaba in nasveti za shranjevanje

- ✓ Iz higieničnih razlogov pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite (v 1 uri, nato zavrzite).
- ✓ Ne pogrevajte obroka v mikrovlnovi pečici zaradi možnosti pregretja.
- ✓ Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku).
- ✓ Porabite v 3 tednih po odprtju.

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:

datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke.

Proizvaja: Nutricia Cuijk B.V., Schuttersweg 12, 5443 PR Haps, Nizozemska

Prodaja: Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, Nizozemska

Distribuira: Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija

Svetovalna linija: 080 15 36, e-mail: info@merit-hp.si, www.aptaclub.si

Aptamil Pregomin ADC

Z prehransko uravnavanje alergije na beljakovine kravjega mleka ali/in malabsorpcije maščob od rojstva naprej
Živilo za posebne zdravstvene namene

- ✓ hipoalergena formula
- ✓ ekstenzivno hidrolizirane beljakovine sirotke
- ✓ srednjeverižni trigliceridi (MCT) in zmanjšana količina laktoze*

Naše strokovno znanje je edinstveno

S 120-imi leti tradicije je Nutricia največji strokovnjak na področju **prehrane v zgodnjem obdobju**. Že več kot 40 let je naša skupina znanstvenikov in strokovnjakov (vec kot 500) pionir v raziskavi otroške hrane.

Te raziskave so nam omogočile razvoj našega **Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care (ADC)**, posebej pripravljenega za dojenčke z diagnosticirano **alerгијо na beljakovine kravjega mleka ali/in malabsorpcijo maščob**.



Aptamil Pregomin ADC: živilo za posebne zdravstvene namene

Naša patentirana mešanica sestavin:

- ✓ ekstenzivno hidrolizirane beljakovine sirotke
- ✓ srednjeverižni trigliceridi (MCT)
- ✓ zmanjšana količina laktoze*

*v primerjavi z začetnim mlekom za dojenčke

Sestavine: glukozni sirup, hidrolizirane beljakovine sirotke (iz mleka), srednjeverižni trigliceridi (kokosovo in/ ali palmovo olje), rastlinska olja (repičino, sončnično, palmovo olje in olje iz Mortieralne Alpina, ekstra sončnično olje), maltodekstrin, kalcijev fosfat, kalijev citrat, emulgator: estri citronske kisline mono- in digliceridov, ribje olje, kalcijev klorid, kalijev dihidrogen fosfat, holin klorid, magnezijev hidrogen fosfat, L-askorbinska kislina, inositol, taurin, natrijev klorid, kalijev klorid, L-karnitin, železov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfa tokoferol acetat, uridin 5'-monofosfat natrijeva sol, citidin 5'-monofosfat, askorbil palmitat, kalcijev D-pantotenat, adenozin 5'-monofosfat, inozin 5'-monofosfat natrijeva sol, nikotinamid, DL-alfa tokoferol, gvanozin 5'-monofosfat natrijeva sol, bakrov sulfat, riboflavin, retinil palmitat, tiamin hidroklorid, piridoksin hidroklorid, kalijev jodid, pteroilmonoglutaminska kislina, natrijev selenit, manganov sulfat, fitomenadion, D-biotin, holekalcerol, cianokobalamin. **Alergeni:** mleko in ribe.

MODRA ŠTEVILKA

((• 080 15 36

Neto: 400g e

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹	Na 100 g mlečnega prahu	EM	Na 100 ml obroka ¹	Na 100 g mlečnega prahu
Energijska vrednost	kJ/kcal	276/66	2063/493	Tiamin (B1)	mg	0,07
Maščobe	g	3,4	25	Riboflavin (B2)	mg	0,14
-nasicene maščobne kisline	g	2,1	16	Niacin (B3)	mg	0,43
-enkrat nenasicene maščobne kisline	g	0,7	5,1	Vitamin B6	mg	0,05
-večkrat nenasicene maščobne kisline	g	0,6	4,2	Folat	µg	14
-linolna kislina (LA)	mg	439	3300	Vitamin B12	µg	0,16
-α-linolenska kislina (ALA)	mg	54	400	Biotin	µg	1,7
-arahidonska kislina (AA)	mg	17	120	Pantotenska kislina	mg	0,54
-dokozaheksanojska kislina (DHA)	mg	17	120	Minerali		
Srednjeverižni trigliceridi (MCT)	g	1,7	12	Natrij	mg	22
Ogličkovih hidrati in od teh	g	7,2	54	Kalij	mg	75
Sladkorji	g	1,1	8,1	Klorid	mg	43
-laktoza	g	0,05	0,39	Kalcij	mg	76
Poliooli				Fosfor	mg	47
-inozitol	mg	7,3	54	Magnezij	mg	5,1
Prehranske vlaknine	g	0	0	Železo	mg	0,72
Beljakovine²	g	1,8	13	Cink	mg	0,67
Beljakovine sirotke	g	1,8	13	Baker	mg	0,05
Sol	g	0,05	0,41	Mangan	mg	0,003
Vitamini				Fluorid	mg	≤0,006
Vitamin A	µg	59	443	Molibden	µg	≤5,9
Vitamin D	µg	1,7	13	Selen	µg	2,9
Vitamin E	mgTE	1,2	8,8	Krom	µg	≤5,9
Vitamin K	µg	4,4	33	Jod	µg	13
Vitamin C	mg	9,3	70	Ostalo		
				L-karnitin	mg	2,1
				Holin	mg	19
				Tavrin	mg	5,4
				Nukleotidi	mg	2,3

¹100 ml obroka = 90 ml vode (zaželeno 40° C)+ 3 merice (13,5 g)

²ekstenzivno hidrolizirane beljakovine kravjega mleka

Priprava

- 1 Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.
- 2 Stekleničko in cucelj sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.
- 3 Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte potrebno količino prekuhanje vode.
- 4 Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte z nožem do roba (ne pritiskajte). V stekleničko z vodo dodajte ustrezeno število meric izdelka.
- 5 Stekleničko zaprite z zamaškom in jo stresajte. Namestite steriliziran cucelj. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C). Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite.
- 6 Stekleničko in cucelj očistite takoj po uporabi. Ostankov hrane ne uporabljajte ponovno. Dobro zaprt izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3 tednih po odprtju.

POMEMBNO OBVESTILO

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oziroma drugim strokovnim osebjem s področja medicine, farmacije oz. prehrane, nege in otroka.

Izdelek se mora uporabljati pod zdravniškim nadzorom.

Aptamil Pregomin ADC je namenjen za posebne zdravstvene namene in se lahko uporablja kot edini vir prehrane dojenčkov od rojstva do 6. meseca starosti. Če dojenčka dojite in mu ponudite hrano po steklenički, se lahko zgodi, da ne bo želel nadaljevati z dojenjem. Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega.

Po določenjem 6. mesecu starosti po nasvetu zdravnika ali medicinske sestre postopoma pričnite z uvajanjem čvrste hrane.