

Sirup za izkašljevanje za otroke

tekoči ekstrakt zmesi listov ozkolistnega trpotca, plodov grenkega navadnega komarčka in korenin jegliča

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate dajati otroku pazljivo in skrbno, da mu bo kar najbolje koristilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Če se znaki otrokove bolezni ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je Sirup za izkašljevanje za otroke in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste otroku dali Sirup za izkašljevanje za otroke
3. Kako dajati otroku Sirup za izkašljevanje za otroke
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje Sirupa za izkašljevanje za otroke
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE SIRUP ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Sirup za izkašljevanje za otroke je namenjen uporabi pri otrocih za lažje izkašljevanje pri kašlju, ki spremlja vnetja zgornjih dihalnih poti ob prehladnih obolenjih. Sirup vsebuje izvleček iz listov ozkolistnega trpotca, plodov grenkega navadnega komarčka in korenin jegliča. Listi ozkolistnega trpotca vsebujejo sluzi, ki prekrijejo sluznico ust in žrela z zaščitno plastjo in jo tako varujejo pred draženjem ter pomirjajo suh, dražeč kašelj. Učinkovine listov ozkolistnega trpotca delujejo tudi protivnetno in protibakterijsko. Plodovi grenkega navadnega komarčka vsebujejo eterično olje in druge učinkovine, ki delujejo protibakterijsko in lajšajo izkašljevanje. Korenine jegliča vsebujejo učinkovine, ki lajšajo izkašljevanje.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE OTROKU DALI SIRUP ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE

Ne dajte otroku Sirupa za izkašljevanje za otroke

Sirupa za izkašljevanje za otroke naj ne jemljejo otroci, ki so preobčutljivi za katerokoli sestavino zdravila, anetol, rastline iz družine kobulnic (latinsko *Apiaceae*) ali rastline iz vrst jegličev. Sirupa ne dajte otrokom, ki imajo astmo ali so v preteklosti imeli hudo vnetje grla in glasilk.

Pri dajanju Sirupa za izkašljevanje za otroke bodite posebno pozorni

Če se otroku stanje ne izboljša v 5 do 7 dneh, ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom. Takoj poiščite zdravniško pomoč ob pojavu oteženega dihanja, vročine ali gnojnega izpljunka. Obisk zdravnika je nujen tudi pri dolgotrajnem obolenju dihal, kroničnem kašlju ali hripavosti ter pojavljanju krvavega izpljunka. Pri otrocih, mlajših od 4 let, svetujemo, da se o uporabi sirupa predhodno posvetujete z zdravnikom.

Sirup vsebuje saharozo, zato ni primeren za osebe s sladkorno boleznijo. Previdnost ob uporabi sirupa je potrebna pri vnetju želodčne sluznice in pri želodčni razjedi.

Glejte poglavje Pomembne informacije o nekaterih sestavinah Sirupa za izkašljevanje za otroke.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če otrok jemlje ali je pred kratkim jemal katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Sirupa za izkašljevanje za otroke z drugimi zdravili.

Jemanje Sirupa za izkašljevanje za otroke skupaj s hrano in pijačo

Neposredno po zaužitju sirupa naj otrok ne uživa hrane in pijače, ker bi le-ta lahko pospešila odstranjevanje sirupa s sluznice ust in žrela.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Sirupa za izkašljevanje za otroke med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Sirup za izkašljevanje za otroke vplival na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah Sirupa za izkašljevanje za otroke

To zdravilo vsebuje 3,8 g saharoze na 1 malo žlico sirupa (5 ml). To morajo upoštevati osebe s sladkorno boleznijo. Če vam je zdravnik povedal, da otrok ne prenaša nekaterih sladkorjev (ima intoleranco za nekatere sladkorje), se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

To zdravilo vsebuje majhne količine etanola (alkohola), in sicer manj kot 100 mg na 1 malo žlico (5 ml).

3. KAKO DAJATI OTROKU SIRUP ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE

Pri uporabi zdravila natančno upoštevajte navodila za uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom.

Otrokom, mlajšim od enega leta, dajte 1/2 male žlice sirupa trikrat do štirikrat dnevno.

Otrokom, starim od 1 do 5 let, dajte 1 malo žlico sirupa trikrat do štirikrat dnevno.

Otrokom, starim od 6 do 12 let, dajte 2 mali žlici sirupa trikrat do štirikrat dnevno.

Pri otrocih, mlajših od 4 let, svetujemo, da se o uporabi sirupa predhodno posvetujete z zdravnikom.

Svetujemo, da med zdravljenjem otrok pije veliko čaja in drugih toplih napitkov.

Pred uporabo steklenico dobro pretresite!

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste otroku dali večji odmerek Sirupa za izkašljevanje za otroke, kot bi smeli

Če ste otroku dali večji odmerek Sirupa za izkašljevanje za otroke, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Preveliko odmerjanje sirupa lahko povzroči razdražen želodec, bruhanje in drisko.

Če ste otroku pozabili dati Sirup za izkašljevanje za otroke

Ne dajte otroku dvojnega odmerka.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Sirup za izkašljevanje za otroke neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V posameznih primerih se lahko pojavijo preobčutljivostne reakcije, želodčne težave, slabost in bruhanje.

Sirup vsebuje saharozo, ki lahko poveča tveganje za razvoj zobnega kariesa.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE SIRUPA ZA IZKAŠLJEVANJE ZA OTROKE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Sirupa za izkašljevanje za otroke ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila, ki jih ne potrebujete, zbirajte ločeno od ostalih odpadkov. O načinu odstranjevanja zdravil se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje Sirup za izkašljevanje za otroke

Zdravilne učinkovine:

5 ml sirupa (1 mala žlica) vsebuje

2,63 g tekočega ekstrakta zmesi listov ozkolistnega trpotca (*Plantago lanceolata* L. s.l., folium), plodov grenkega navadnega komarčka (*Foeniculum vulgare* Miller sp. *vulgare* var. *vulgare*, fructus) in korenin jegliča (*Primula species*, radix), ki ustreza 0,26 g listov ozkolistnega trpotca, 0,06 g plodov grenkega navadnega komarčka in 0,06 g korenin jegliča. Ekstrakcijsko topilo: prečiščena voda, etanol.

Pomožne snovi: saharoza, prečiščena voda, etanol, natrijev benzoat (E211).

Izgled Sirupa za izkašljevanje za otroke in vsebina pakiranja

Sirup za izkašljevanje za otroke je bistra, gosta tekočina, rumenorjave barve, značilnega vonja po zeliščih ter značilnega sladkega okusa.

Pri tekočih zdravilih rastlinskega izvora lahko nastane med shranjevanjem rahla usedlina.

Pakiranje je škatla s steklenico, v kateri je 150 ml sirupa, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje Sirupa za izkašljevanje za otroke

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Sirup za izkašljevanje za otroke je galenski izdelek.

Proizvajalec

Gorenjske lekarnе, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo odobreno 1.12.2014.

