

Navodilo za uporabo

MariDERM BORVAZELIN

30 mg/g mazilo
borova kislina

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 do 2 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo MariDERM Borvazelin in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo MariDERM Borvazelin
3. Kako uporabljati zdravilo MariDERM Borvazelin
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila MariDERM Borvazelin
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO MARIDERM BORVAZELIN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo MariDERM Borvazelin vsebuje borovo kislino v mazilni podlagi. Borova kislina deluje protiglivično in protibakterijsko.

Zdravilo MariDERM Borvazelin uporabljamo za zdravljenje glivičnih obolenj kože, ki jih spremljata blaga rdečina in suho luščenje povrhnjice. Uporabljamo ga lahko tudi za zdravljenje blažjih oblik ekcemov in drugih blažjih vnetij kože.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 do 2 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MARIDERM BORVAZELIN

Ne uporabljajte zdravila MariDERM Borvazelin:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) borovo kislino ali druge sestavine zdravila (glejte poglavje 6).
- na ranah, sluznicah ali večjih površinah kože (večjih od površine 1 do 2 dlani), ker lahko to privede do kopičenja borove kisline v telesu. Kopičenje borove kisline v telesu lahko povzroči toksične učinke (glejte poglavje 4),
- pri dojenčkih in otrocih, mlajših od 3 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo je namenjeno samo za zunanjo uporabo in ga ne smete zaužiti!

Ob pojavu znakov hujše okužbe kože se morate posvetovati z zdravnikom.

Pazite, da zdravilo MariDERM Borvazelin ne pride v stik z očmi ali sluznicami. Če se to zgodi, izpirajte prizadete dele z veliko količino mlačne vode. V primeru poškodbe oči poiščite zdravniško pomoč.

Otroci

Zdravilo MariDERM Borvazelin ni primerno za uporabo pri dojenčkih in otrocih, mlajših od 3 let.

Druga zdravila in zdravilo MariDERM Borvazelin

Ni podatkov o medsebojnem delovanju zdravila MariDERM Borvazelin z drugimi zdravili.

Na prizadeti del kože sočasno ne nanašajte tega zdravila in drugih pripravkov za nego ali zdravljenje kože.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Ker ni dovolj podatkov o varnosti tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva. Podatkov o vplivu zdravila MariDERM Borvazelin na plodnost ni.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo MariDERM Borvazelin pri pravilni uporabi vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILLO MARIDERM BORVAZELIN

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Način uporabe in odmerjanje

Odrasli in otroci, starejši od 3 let:

Zdravilo MariDERM Borvazelin nanesite v tankem sloju na očiščeno in osušeno obolelo mesto 2-krat dnevno.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 do 2 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila MariDERM Borvazelin, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, mazilo odstranite s kože z milom in mlačno vodo.

Podatkov o toksičnih učinkih po prevelikem odmerjanju tega zdravila ni. Če se po prevelikem odmerjanju pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo MariDERM Borvazelin

Če ste pozabili uporabiti zdravilo MariDERM Borvazelin, ga uporabite, ko bo to mogoče. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpuscite in mazilo nanesite ob predvidenem času. Ne nanesite dvojne količine mazila, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V posameznih primerih se lahko pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije ali draženje kože.

Absorpcija borove kisline skozi nepoškodovano kožo je zanemarljiva. Prehod borove kisline v telo je večji v primeru zaužitja ali nanosa na poškodovano kožo in na rane, zlasti če se nanaša na velike površine.

V literaturi opisani neželeni učinki zaradi kopičenja borove kisline v telesu so: dermatitis, izpuščaj, izpadanje las in dlak (alopecija), slabost, bruhanje, driska, motnje prebavne funkcije, pomanjkanje ali izguba

teka (anoreksija), motnje menstruacije, slabokrvnost (anemija), šibkost, zmedenost, mišični krči (konvulzije).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MARIDERM BORVAZELIN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte dobro zaprto pri temperaturi do 25 °C na suhem mestu.

Shranjujte v originalni ovojnini, zaščiteno pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »Uporabno do:« in na tubi poleg oznake »rok uporabe:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo MariDERM Borvazelin

Učinkovina je borova kislina (*Acidum boricum*).

1 g mazila vsebuje 30 mg borove kisline.

Pomožni snovi sta beli vazelin in tekoči parafin.

Izgled zdravila in vsebina pakiranja

Zdravilo MariDERM Borvazelin je belo mazilo, mastnega otipa, brez vonja. Pakirano je v škatlo s tubo z 20 g mazila.

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

MariDERM Borvazelin je galensko zdravilo.

Lekarne Maribor
Minařikova ulica 6
2000 Maribor



Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na Službo za raziskave in razvoj proizvajalca, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor; telefon: 02 450 28 00, e-pošta: info@mb-lekarne.si.

Datum zadnje revizije besedila:

20. julij 2017