



Glicerinske svečke za odrasle

svečke
85-odstotni glicerol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše boleznii poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

- Kaj vsebuje navodilo:**
1. Kaj je zdravilo Glicerinske svečke za odrasle in za kaj ga uporabljamo
 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glicerinske svečke za odrasle
 3. Kako uporabljati zdravilo Glicerinske svečke za odrasle
 4. Možni neželeni učinki
 5. Shranjevanje zdravila Glicerinske svečke za odrasle
 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Glicerinske svečke za odrasle so blago odvajalo s hitrim nastopom odvajalnega učinka. Pomagajo pri akutnem zaprtju, ko odvajanje blata izostane nekaj zaporednih dni, na primer zaradi spremembe okolja. Svetujemo jih pri stanjih, ko je potrebno neboleče odvajanje mehkega blata, na primer pri hemoroidih, razjedah okrog zadnjične odprtine in po kirurških posegih. Zdravilo lahko uporabite tudi za izpraznitev črevesja pred rektalnimi preiskavami. Svečke vsebujejo glicerol, ki poveča vsebnost vode v blatu, ga tako mehča in poveča njegovo drsljivost, kar olajša odvajanje blata. Prek rahlega draženja sluznice danke sproži tudi refleks odvajanja. Odvajalni učinek običajno nastopi v 20-30 minutah, včasih pa šele po 90 minutah.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Ne uporabljajte zdravila Glicerinske svečke za odrasle

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila
- pri sumu na vnetje slepiča.

Enako kot velja za vsa odvajala, Glicerinskih svečk za odrasle ne uporabljamo v primeru, ko zastoj blata spremljajo nepojasnjene akutne ali kronične prebavne težave, kot so trebušna bolečina, slabost, bruhanje, saj so to lahko znaki črevesne zapore.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše boleznii poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Glicerinske svečke za odrasle niso primerne za dolgotrajno uporabo, na primer pri kroničnem zaprtju.

Ni za uživanje!

Otroci in mladostniki

Glicerinske svečke za odrasle niso namenjene za uporabo pri otrocih, mlajših od 12 let. Svetujemo, da pri otrocih, mlajših od 12 let, uporabite Glicerinske svečke za otroke.

Druga zdravila in zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Glicerinskih svečk za odrasle z drugimi zdravili.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Glicerinske svečke za odrasle lahko uporabljajo nosečnice in doječe matere.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Glicerinske svečke za odrasle vplivale na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Običajni odmerek sta 1 do 2 svečki dnevno.

Svečko uporabite tako, da pretrgate dvojni trak po zarezi, izluščite svečko in jo vstavite s konico naprej globoko v danko, kjer jo zadržite vsaj 15 minut.

Če odvajalni učinek ne nastopi v 90 minutah, lahko uporabite še 1 svečko.

Opozorilo: uporabljena svečka se običajno izloči nerazpadla, skupaj z blatom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glicerinske svečke za odrasle, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Glicerinskih svečk za odrasle lahko povzroči močnejše draženje sluznice danke in drisko.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Glicerinske svečke za odrasle lahko predvsem pri občutljivih posameznikih ali osebah s poškodovano črevesno sluznico povzročijo draženje sluznice danke.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem mestu, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvrči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Glicerinske svečke za odrasle

1 svečka vsebuje 2,0 g 85-odstotnega glicerola.

Pomožne snovi: stearinska kislina, brezvodni natrijev karbonat, prečiščena voda.

Izgled zdravila Glicerinske svečke za odrasle in vsebina pakiranja

Glicerinske svečke za odrasle so trdne svečke, koničaste oblike, prozorne do belkaste barve.

Pakiranje je škatla, v kateri je 10 svečk (2 x 5 svečk v dvojnem traku, v plastični vrečki), s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Glicerinske svečke za odrasle

Izdaja zdravila je na recept in brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 30. 9. 2020.

